

## Biologischer Spritzplan für Obstgehölze

### Winterspritzung

**Zeitraum:** Januar – März.

**Gegen:** Alle überwinternden Insektenarten an großen Ästen, Zweigen und Stämmen.

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM plus 10 % BRENNNESSEL-EXTRKT COMPOSITUM nach Konzentrationsangabe.

**Spritzart:** Zweige, Äste und Stämme werden von allen Seiten regelrecht abgewaschen.

### Vorblütespritzungen

**Gegen:** Pilzinfektionen und zur Verdrängung von Insekten.

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** STEINMEHL 2-3 % in BRENNNESSEL-EXTRAKT COMPOSITUM mit ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM oder Spritzbrühe aus MEERESALGEN-KALK bzw. VINALGA. Bei besonders mehltauggefährdeten Pflanzen mit Zusatz von 0,4 % BLATTGRÜN-Pflanzenreiniger, bei Kräuselkrankheit des Pfirsichs ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM mit Zusatz von 0,1 % Kupfer.

**Spritzart:** Feuchte Spritzung gezielt auf Knospen, Zweige und Stämme.

### Blütespritzung

**Gegen:** Pilzgefahren und zur Verdrängung von Insekten.

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** Bei feuchter Witterung, Zusatz von allerfeinstem STEINMEHL 2 %ig. Bei starker Gefahr von echtem oder falschem Mehltau, Zusatz von 0,3 % BLATTGRÜN-Pflanzenreiniger. Kein Insektizidzusatz!

**Spritzart:** Mittelfeuchte gezielte Sprühung auf Blüten und Zweige.

### Nachblütespritzung

**Gegen:** Pilzinfektionen und zur Verdrängung von Insekten.

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** Pflanzenextrakt aus ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM und BRENNNESSEL-EXTRKT COMPOSITUM.

Bei starker Pilzgefahr infolge feuchter Witterung mit Zusatz von BLATTGRÜN-Pflanzenreiniger oder Einsatz von MEERESALGEN-KALK. Bei schwachem Insektenbefall, Anreicherung der Spritzbrühe mit Seifenextrakt 1 bis 3 %ig, bei starkem Befall mit Pyrethrumextrakt 0,1 %ig.

**Spritzart:** Mittelfeucht, gezielt auf grüne Triebe und Äste.

### Sommerspritzungen

**Gegen:** Pilzinfektionen und zur Verdrängung von Insekten

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** Pflanzenextrakt aus ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM, BRENNNESSEL-EXTRKT COMPOSITUM und Zwiebel. Zusatz von STEINMEHL bis 3%ig. Bei starker Infektionsgefahr infolge feuchter Witterung unter Zusatz von 0,2 % Schwefel. Bei schwachem Insektenbefall mit Zusatz von Seifenbrühe, gegebenenfalls Sonderspritzungen mit Pyrethrumextrakt 0,1 %ig. Bei Auftreten von Spinnen oder Milben Sonderspritzungen mit Pflanzenextrakt unter Zusatz von 3 % STEINMEHL oder BENTONIT.

**Spritzart:** Feinste Benetzung aller grünen Teile und Zweige, nicht tropfnass, so dass der Boden von Spritzbrühen möglichst frei bleibt.

### Herbstspritzung – Abschlusspritzung

**Gegen:** Spätinfektion von Pilzkrankungen, zur Verdrängung von Insekten.

**Zusammensetzung der Spritzbrühe:** Pflanzenextrakt aus ACKERSCHACHTELHALM-EXTRAKT COMPOSITUM und BRENNNESSEL-EXTRKT COMPOSITUM sowie Zwiebeln. Bei starker Pilzgefahr Zusatz von 3 % STEINMEHL. Nur bei sehr starker Pilzinfektion reinen BLATTGRÜN-Pflanzenreiniger. Nur bei sehr starkem Insektenbefall Zusatz von 0,1 % Pyrethrumextrakt.

**Spritzart:** Alle grünen Teile, besonders aber die Fruchtreion sorgfältig von allen Seiten einsprühen.